



Tout porc introduit dans l'élevage doit être obligatoirement déparasité.

### Qui ? : Truie

Quand ? : Période	Quoi ? : Traitements	Pourquoi ? : Explications
En période de saillie	vitamines et/ou minéraux	pour stimuler la production d'ovules
	écrire la date de la saillie et calculer la date de la mise bas (+ 3 mois + 3 sem+ 3 jours)	
à 3 mois de gestation	vitamines et/ou minéraux	pour favoriser la croissance des porcelets
14 jours avant la mise bas	Préparation de la maternité:	
	- lavage et décapage des murs et sols	avant de désinfecter, il faut que l'endroit soit propre
	- désinfection, vide sanitaire d'au moins 5 jours	pour éliminer les microbes dans le boxe
	- faire attention que la truie mange et boive assez	mettre de l'eau propre dans l'abreuvoir
7 jours avant la mise bas	- Lavage de la truie au savon	pour éliminer les microbes sur la peau
	- déparasitage interne + externe (Ivermectine)	pour éliminer les parasites sur la peau et dans l'intestin
	- transfert de truie en maternité	
	- préparation du nid à porcelets (en saison froide)	pour éviter le refroidissement des porcelets
	- faire attention que la truie mange et boive assez	mettre de l'eau propre dans l'abreuvoir
jour de la mise bas	- faire attention à la truie	la température rectale >39,5°C = fièvre --> traitement antibiotique + anti-inflammatoire
	vitamines et/ou minéraux	
tous les 6 mois	déparasitage interne + externe (Ivermectine)	pour éliminer les parasites sur la peau et dans l'intestin

### Qui ? : Verrat

Quand ? : Période	Quoi ? : Traitements	Pourquoi ? : Explications
tous les 1e du mois	vitamines/minéraux	
tous les 6 mois	déparasitage interne + externe (Ivermectine)	pour éliminer les parasites sur la peau et dans l'intestin

## Qui ? : Porcelets

Quand ? : Période	Quoi ? : Traitements	Pourquoi ? : Explications
jour de naissance	noter la date de mise bas	
	désinfecter l'ombilical avec la teinture d'iode (ne pas sectionner )	pour éviter l'infection de l'ombilical
à l'âge de 3 jours	veiller à la 1ère tétée	le colostrum est très important
	1ère injection de fer	il n'y pas assez de fer dans le lait de la mère
	diarrhée --> traiter tous les porcelets contre colibacillose	l'hygiène autour la mise bas et quelque jours après est très importante pour éviter l'infection des porcelets!!! Ils n'ont pas assez de résistance!
à l'âge de 10 jours	2è injection de fer + distribution de l'aliment au porcelet	après cela les porcelets sont capables d'absorber le fer de l'aliment ou de la terre ( mettre une pelle de terre dans l'étable par jour)
à l'âge de 15 jours	castrer les mâles selon le choix de l'éleveur	utiliser un bistouri propre, désinfecter à la teinture d'iode + antibiothérapie locale après l'intervention
sevrage	déparasitage interne + externe (Ivermectine)	pour éliminer les parasites sur la peau et dans l'intestin
	vitamine/minéraux	pour aider pendant la période de stress du sevrage
à l'âge de 5 mois	déparasitage interne + externe (Ivermectine)	pour éliminer les parasites sur la peau et dans l'intestin

Pour éviter que les porcelets jouent avec la queue d'un autre ou détruisent les murs/sol --> mettez un objet dans le boxe

### En cas de blessure

1. Enlever ce qui a blessé l'animal ou séparer les porcs qui se battent.
2. Deux fois par jour, laver avec un mélange d'eau, de savon, d'eau de javel.
3. Laisser sécher
4. Pour que la plaie se ferme plus vite, mettre du mercurochrome, de la teinture d'iode ou du bleu de méthylène.

### Pour soigner la gale

1. La porcherie doit être bien nettoyée et désinfectée.
2. Frotter la plaie et les croûtes avec un chiffon ou une brosse trempée dans un mélange d'eau et d'insecticide (on peut aussi utiliser de l'huile de vidange de voiture)

Il existe aussi de bons médicaments : Tigal, Lindane, Bestox