Bon à savoir 🗢 Par la vaccination, on se protège soi-même et on protège aussi ceux qui ne peuvent pas recevoir de vaccins. 🜟 Les vraies contre-indications aux vaccins sont rares : allergies graves aux composants vaccinaux ou réactions importantes à une dose antérieure. Parlez-en au médecin. 🜟 Des réactions peuvent parfois survenir après une vaccination. Elles sont le plus souvent sans gravité : rougeur et douleur à l'endroit de l'injection, fièvre de courte durée.

Actualités 🌣 En 2013, le nombre de cas de coqueluche a fortement augmenté en Wallonie pour atteindre 409 cas. Cette augmentation touche particulièrement les très jeunes enfants de moins de 6 mois dont la protection par la vaccination ne peut être complète qu'après les 3 premières doses. La vaccination contre la coqueluche doit être régulièrement entretenue par des rappels notamment à 5-6 ans et puis à 15-16 ans. Ces vaccinations permettent de transmission de la coqueluche des adolescents et des adultes

烷 Depuis janvier 2014, la FWB @-vax met en place progressivement, pour tous les vaccinateurs, un nouveau système de commandes de vaccins lié à la constitution d'un registre de données vaccinales pour les enfants de º à 2º ans. 🜟 Cette centralisation permettra d'éviter des injections supplémentaires liées à la perte de documents vaccinaux attestant d'une vaccination. 🜟 Dans le respect des règles de la protection de la vie privée, chaque vaccinateur est donc invité à noter dans ce registre les vaccinations qu'il réalise. 🚖 Lors des prochaines vaccinations de votre enfant, le médecin vous fournira de plus amples informations. Si vous ne souhaitez pas que ses données vaccinales soient enregistrées vous pouvez le lui signaler. 🜟 Seuls les médecins vaccinateurs ont actuellement accès à ce registre.



Pour en savoir plus, consultez le site www.sante.cfwb.be, rubrique vaccination.



L'âge

des rappels

de vaccination

Votre enfant est-il bien vacciné?

Edition juin 2014



the street of th contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, en une seule injection. 🕏 Tout enfant qui n'a pas encore reçu le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons doit le recevoir.

Que faire? * Vous pouvez faire vacciner votre enfant par le médecin de votre choix : médecin traitant (pédiatre ou généraliste), médecin de la consultation de l'ONE ou médecin scolaire. Attention, seules certaines équipes en PSE organisent la vaccination des enfants en 3^{ème} maternelle ; néanmoins elles vérifient toutes l'état vaccinal des enfants lors du bilan de santé de 2^{eme} primaire. Si nécessaire, elles assurent à ce moment la vaccination de rattrapage, sur votre autorisation signée et correctement complétée. 😕 Faites noter les vaccins donnés sur la carte de vaccination ou dans le carnet de l'enfant.

Calendrier de vaccination 2014	Nourrissons						Enfants et adolescents			
	8 :	semaines 2 mois	12 semaines 3 mois	16 semaines 4 mois	12 mois	15 mois	5-6 ans	11-12 ans	13-14 ans	15-16 ans
Poliomyélite										
Diphtérie	n t			0		0				
Tétanos	a l e					0				
Coqueluche	e x a v	•	•	0		0				
Haemophilus influenzae de type b	Ĕ	•	•	0		0				
Hépatite B										
Rougeole										
Rubéole 🚆										
Oreillons										
Méningocoque C						•				
Pneumocoque		•			•					
Rotavirus (vaccin oral)		_		(🔼)						
Papillomavirus (HPV)									××	

des ans. Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccinations avec lui.

Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit Vaccin combiné (une seule injection) Recommandé aux jeunes filles et gratuit (2 doses) à d'autres âges, en fonction de l'état de santé individuel.

Quels vaccins à 11-12 ans?

L'administration d'une deuxième dose de vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) est recommandée à tous les enfants. C'est souhaitable quelque soit l'âge auquel la première dose a été donnée. Une deuxième dose permet de protéger les enfants non encore vaccinés et de renforcer chez les enfants vaccinés la protection reçue dans la petite enfance. 🜟 🖰 partir de cet âge et jusqu'en 2^{ème} secondaire, une vaccination de rattrapage contre l'hépatite B est possible, en 2 doses (vaccin adulte), à intervalle de 4 à 6 mois. Certaines équipes de PSE proposent le rattrapage en 6^{ème} primaire, d'autres en 2^{ème} secondaire (voir document fourni par la PSE).

Que faire ? 🌣 Vérifiez si l'enfant a déjà reçu deux doses de vaccin RRO et 3 doses de vaccin contre l'hépatite B. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire vacciner par le médecin traitant (généraliste ou pédiatre) ou par le médecin scolaire, s'il le propose. 🔭 Faites noter les vaccins donnés sur la carte de vaccination. 💝 Elle reste utile toute la vie : stage sportif, voyage, accident, etc. Elle contient des renseignements précieux : vaccins reçus, dates, prochains rappels. Invitez donc votre enfant à en

garder une photocopie sur lui.